

Le rôle des médicaments dans la prise en charge de l'œsophagite à éosinophiles

Plusieurs médicaments se sont révélés efficaces pour traiter les patients atteints d'œsophagite à éosinophiles (EoE).



Les traitements visent à réduire l'inflammation de l'œsophage, dans l'espoir de diminuer le risque de formation de fibrose (tissu cicatriciel) et de sténoses (rétrécissement) dans l'œsophage.

Traitement par inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)

- Les IPP sont des bloqueurs d'acide très efficaces, utilisés depuis des décennies pour traiter le reflux gastro-œsophagien.
- Ils sont souvent le premier médicament prescrit pour le traitement de l'EoE.

1

COMMENT ILS FONCTIONNENT :

Les IPP semblent agir dans l'EoE en bloquant directement ou en interagissant avec les protéines responsables de l'attraction des éosinophiles dans les tissus.

DISPONIBILITÉ ET PRIX :

Ils sont disponibles dans presque toutes les pharmacies et, si la dose se présente sous la forme d'une pilule standard, ils ne sont pas chers.

COMMENT ILS FONCTIONNENT :

Les stéroïdes topiques avalés agissent comme les autres stéroïdes, en ce sens que leur principale action est de réduire l'inflammation, mais ils agissent localement sur la paroi superficielle de l'œsophage.

DISPONIBILITÉ ET PRIX :

La fluticasone MDI est disponible dans presque toutes les pharmacies en raison de son utilisation dans l'asthme, mais la dose et l'administration sont différentes dans l'EoE. Le budésonide liquide peut être mélangé et avalé, mais il a connu des problèmes d'approvisionnement. Un comprimé à dissoudre contenant du budésonide est également disponible au Canada et est approuvé pour les adultes souffrant d'EoE.

COMMENT ILS FONCTIONNENT :

Il agit en bloquant les protéines du système immunitaire (appelées interleukine 4 et interleukine 13) qui sont fortement impliquées dans la voie inflammatoire de l'œdème de Quincke.

DISPONIBILITÉ ET PRIX :

Le médicament est très cher et, au Canada, il est actuellement couvert par certaines assurances privées, mais pas par les formulaires provinciaux.

Corticostéroïdes topiques avalés

- Ils agissent à la surface de la muqueuse œsophagienne et sont très efficaces pour calmer l'inflammation observée dans l'EoE.
- Les deux principaux types de corticostéroïdes utilisés pour le traitement de l'EoE sont la fluticasone et le budésonide.

2

Thérapie biologique

- Le dupilumab est le médicament le plus récent, une injection qui a été approuvée pour le traitement de l'EoE au Canada pour les patients âgés de plus de 12 ans et pesant plus de 40 kg.

3

Thérapie d'entretien

Ces médicaments ne sont pas efficaces pour soulager instantanément les symptômes et doivent être utilisés pendant plusieurs semaines avant d'être bénéfiques. Une utilisation régulière du médicament est nécessaire !

